

## الف : گروه هدف واکسیناسیون

- ۱- همه مادران باردار ۳۵ ساله و بالاتر
- ۲- مادران شاغل در بهداشت و درمان
- ۳- مادران باردار دارای همسر شاغل در بخش کرونا و یا مراکز بهداشتی مدیریت کرونا
- ۴- مادران شاغل در گروههای شغلی اولویت دریافت واکسن ( معلم ، آرایشگر و ... )
- ۵- مادران با بارداری های دوقلویی و چندقلویی
- ۶- بارداری با IVF
- ۷- مادران باردار چاق با نمایه توده بدنی (BMI) ۳۵ و بالاتر
- ۸- مادران باردار با بیماری زمینه ای شامل دیابت ، دیابت بارداری ، بیماری قلبی ، فشار خون بالا ، مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی (مانند کورتون روزانه) ، بیماری های مزمن کلیوی ، کم خونی سیکل سل ، پیوند اعضا ، سیروز کبدی ، آسم



MH-QI-HE-26



## واکسیناسیون کرونا در بارداری

مادر عزیز اگر چه مادران باردار در معرض خطر بالاتر ابتلا به بیماری کرونا نمی باشند اما در صورت ابتلاء، اشکال شدیدتر بیماری نسبت به زنان غیرباردار، در سن مشابه بیشتر خواهد بود، لذا دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای واکسیناسیون کرونا در مادران باردار، با توضیحات زیر در دسترس شما قرار می گیرد تا آگاهی لازم صورت پذیرد و واکسیناسیون که منوط به رضایت مادر پس از مشاوره می باشد در مرکز بهداشت و تحت نظر کمیته دانشگاهی واکسیناسیون مادران باردار انجام شود.

## ب: توضیحات و تذکرات

- ۱- به علت خطرات ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در سه ماهه سوم بارداری، واکسیناسیون مادران واجد شرایط با سن بارداری ۲۸ هفته و بیشتر در اولویت می باشد.
- ۲- تا حصول نتایج کافی و مستندات لازم در مورد بی خطری واکسن برای جنین، ترجیحا واکسیناسیون بعد از هفته ۱۲ بارداری صورت پذیرد.
- ۳- واکسیناسیون به معنای ایجاد ایمنی قطعی نیست و تداوم اقدامات پیشگیری از ابتلا به کرونا برای مادر باردار و اعضای خانواده الزامی است.
- ۴- در حال حاضر توصیه وزارت بهداشت واکسن سینوفارم به علت ماهیت آن (ویروس غیر فعال) به مادران باردار می باشد.

- ۵- در صورت عدم اطلاع از بارداری و تزریق دوز اول واکسن کرونا و یا وقوع بارداری پس از دوز اول بهتر است مشاوره با پزشک خود انجام داده و توصیه به دریافت دوز دوم با فاصله ۴ هفته و یا پس از هفته ۱۲ بارداری بر اساس مشاوره با پزشک می شود.
- ۶- تزریق روگام تداخلی با واکسن کرونا ندارد.
- ۷- بهتر است بین واکسن کرونا و دریافت واکسن های آنفلوآنزا و یا کزاز در بارداری حداقل ۲ هفته فاصله باشد.
- ۸- در صورت بروز علائم پس از واکسن، حتما به مرکز بهداشت و یا سامانه ۴۰۳۰ با کد ۴ اطلاع داده شود.