

علایم هشدار در بخیه زخم

در صورت بروز هر یک از علایم زیر مجدداً به اورژانس یا پزشک مراجعه کنید :

- آسیب یا پارگی بخیه ها و باز شدن مجدد زخم
- درد شدید، تورم یا قرمزی در محل زخم
- خروج چرک یا ترشحات سبز رنگ از زخم یا افزایش ترشحات اولیه
- استنشام بوی بد از زخم و بروز تب
- خونریزی مجدد زخم به طوری که پس از ۱۰-۱۵ دقیقه فشار مداوم روی محل زخم متوقف نشود
- محدودیت حرکت در انگشتان یا مفاصل نزدیک به زخم

در بخیه های غیر قابل جذب :

- زمان معمولی کشیدن بخیه های صورت معمولاً ۶-۳ روز بعد.
- زمان معمولی کشیدن بخیه های پوست سر و اندام ها ۱۴-۷ روز بعد می باشد.
- طبق دستور پزشک تعویض پانسمان را انجام دهید
- در صورت خیس شدن ، کثیف شدن، آلودگی به ترشح یا خونابه هم نیاز به تعویض پانسمان خواهید داشت.
- بخیه های غیر قابل جذب را پس از ۲۴ ساعت می توانید به آرامی با آب گرم و صابون بشوئید، اما به هیچ وجه آنها را به مدت طولانی در آب غوطه ور نکنید.
- در صورتی که هنگام ترخیص برای شما آنتی بیوتیک تجویز شده است دارو را در زمان معین مصرف کرده و دوره ی درمان را کامل کنید.

شماره تماس با بخش اورژانس

شماره داخلی 133 +21-55062628