



آمادگی جهت انجام گرافی رنگی سیستم اداری ( IVP ) کد: MH-QI-۲۱۸



واحد تصویربرداری

مهروه های کمری (L/S) - KUB و داپلر کلیه

- \* روز قبل از رادیوگرافی نهار و شام سوپ بدون حبوبات میل نمائید.
- \* شام (سوپ ساده) ساعت شش شب میل شود ساعت هفت شب به میزان شصت گرم شربت سناگراف (میل نمائید).
- \* در صورت داشتن سابقه یبوست بخش رادیولوژی رامطلع سازید. \*\*\*\*\*
- \* حدود ساعت ده شب تعداد چهار عدد قرص دایمتیکون (ضد نفخ) هرپانزده دقیقه بامقداری آب جویده شود.
- \* پس از خوردن شربت سناگراف و قرصهای مذکور هیچ چیز دیگری بجز مایعات میل نشود.
- \* صبح روز انجام رادیوگرافی ناشتا مراجعه نمائید.

رئیس واحد تصویربرداری : خانم دکتر کشاورز



آمادگی جهت انجام گرافی رنگی سیستم اداری ( IVP ) کد: MH-QI-۲۱۸



واحد تصویربرداری

مهروه های کمری (L/S) - KUB و داپلر کلیه

- \* روز قبل از رادیوگرافی نهار و شام سوپ بدون حبوبات میل نمائید.
- \* شام (سوپ ساده) ساعت شش شب میل شود ساعت هفت شب به میزان شصت گرم شربت سناگراف (میل نمائید).
- \* در صورت داشتن سابقه یبوست بخش رادیولوژی رامطلع سازید. \*\*\*\*\*
- \* حدود ساعت ده شب تعداد چهار عدد قرص دایمتیکون (ضد نفخ) هرپانزده دقیقه بامقداری آب جویده شود.
- \* پس از خوردن شربت سناگراف و قرصهای مذکور هیچ چیز دیگری بجز مایعات میل نشود.
- \* صبح روز انجام رادیوگرافی ناشتا مراجعه نمائید.

رئیس واحد تصویربرداری : خانم دکتر کشاورز



آمادگی جهت انجام گرافی رنگی سیستم اداری ( IVP ) کد: MH-QI-۲۱۸



واحد تصویربرداری

مهروه های کمری (L/S) - KUB و داپلر کلیه

- \* روز قبل از رادیوگرافی نهار و شام سوپ بدون حبوبات میل نمائید.
- \* شام (سوپ ساده) ساعت شش شب میل شود ساعت هفت شب به میزان شصت گرم شربت سناگراف (میل نمائید).
- \* در صورت داشتن سابقه یبوست بخش رادیولوژی رامطلع سازید. \*\*\*\*\*
- \* حدود ساعت ده شب تعداد چهار عدد قرص دایمتیکون (ضد نفخ) هرپانزده دقیقه بامقداری آب جویده شود.
- \* پس از خوردن شربت سناگراف و قرصهای مذکور هیچ چیز دیگری بجز مایعات میل نشود.
- \* صبح روز انجام رادیوگرافی ناشتا مراجعه نمائید.

رئیس واحد تصویربرداری : خانم دکتر کشاورز



آمادگی جهت انجام گرافی رنگی سیستم اداری ( IVP ) کد: MH-QI-۲۱۸



واحد تصویربرداری

مهروه های کمری (L/S) - KUB و داپلر کلیه

- \* روز قبل از رادیوگرافی نهار و شام سوپ بدون حبوبات میل نمائید.
- \* شام (سوپ ساده) ساعت شش شب میل شود ساعت هفت شب به میزان شصت گرم شربت سناگراف (میل نمائید).
- \* در صورت داشتن سابقه یبوست بخش رادیولوژی رامطلع سازید. \*\*\*\*\*
- \* حدود ساعت ده شب تعداد چهار عدد قرص دایمتیکون (ضد نفخ) هرپانزده دقیقه بامقداری آب جویده شود.
- \* پس از خوردن شربت سناگراف و قرصهای مذکور هیچ چیز دیگری بجز مایعات میل نشود.
- \* صبح روز انجام رادیوگرافی ناشتا مراجعه نمائید.

رئیس واحد تصویربرداری : خانم دکتر کشاورز

