



شوند و یکی از این روش ها **ای وی اف** یا **میکرو اینجکشن** میباشد

میکرواینجکشن ICSI

لقاح آزمایشگاهی یا میکرواینجکشن روشی است که در آن ابتدا تحریک تخمک گذاری با تزریق آمپول در خانم صورت میگیرد. نیاز



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
و درمانی شهید بهشتی

مرکز پزشکی آموزشی و درمانی مهدیه

به چندین بار انجام سونوگرافی و کنترل پاسخ تخمدانی می باشد در زمانی که پاسخ تخمدانی مناسب باشد آخرین تزریق انجام و ۳۵ تا ۳۸ ساعت بعد و تحت بیهوشی کوتاه مدت تخمکها از راه واژن با کمک سونوگرافی واژینال خارج می گردند.

این تخمک ها در آزمایشگاه جنین شناسی و با وسایل پیشرفته با اسپرم تلقیح شده و جنین حاصل در دستگاههای مخصوص به نام انکوباتور نگهداری می شود جنین در سن ۳ تا ۵ روزگی بر اساس شرایط رشد و وضعیت رحم مادر به داخل رحم منتقل میگردد.

مصرف دارو حین تحریک تخمک گذاری، پس از گرفتن تخمک و نیز پس از انتقال جنین

ناباروری چیست؟

ناباروری به حالتی گفته می شود که شما به مدت شش ماه تا یک سال (بسته به سن شما) به صورت محافظت نشده رابطه جنسی داشته باشید ولی باردار نشوید.

در حال حاضر در جهان میلیون ها کودک زندگی می کنند که با شیوه حاملگی خارج رحمی (IVF) به دنیا آمده اند. جدا از این شیوه راه های دیگری هم برای حل مشکل ناباروری وجود داد و حالا امکانات و پیشرفت های جدید بیش از نیمی از زوج هایی که پیش تر «نابارور» تلقی می شدند صاحب فرزند می

بخش ناباروری صبحی

درمان کمک باروری ای وی اف
یا IVF

میکرواینجکشن ICSI

بسیار مهم بوده و باید حتماً طبق دستور پزشک انجام گیرد.

از آنجا که عمل گرفتن تخمک نیاز به بیهوشی عمومی دارد باید بیمار در آن روز حداقل ۶ تا ۸ ساعت ناشتا باشد ولی برای انتقال جنین نیازی به بیهوشی نیست پس لزومی بر ناشتا بودن وجود ندارد

بعد از عمل چه اقداماتی ضروری میباشد

پس از گرفتن تخمک دستور مصرف پروژسترون به بیمار داده میشود . داروهای تقویتی قبلی طبق دستور باید ادامه یابد . فعالیت عادی منعی ندارد بهتر است نزدیکی صورت نگیرد .

پس از انتقال جنین

بعد از یک ساعت استراحت در بخش میتوانید مرخص شوید.

جنین های اضافی با کیفیت مناسب طبق نظر جنین شناس و در صورت تمایل شما فریز می شوند.

لطفا دستورات دارویی قبلی را ادامه دهید.

داروهای تجویز شده خوراکی تزریقی و یا شیاف های واژینال را تا زمان انجام آزمایش به هیچ عنوان قطع نکرده و در صورت اتمام داروها به بخش مراجعه کرده تا مجدداً نسخه شود.

کار های شخصی مانند دستشویی رفتن و یا نشستن اشکال ندارد از انجام کارهای سنگین خودداری نمایید.

به هیچ عنوان نزدیکی نداشته باشید.

در صورت لکه بینی و یا کمر درد غیر معمول حتماً اطلاع دهید .

رژیم غذایی خاصی توصیه نمیگردد.

و در نهایت

آزمایش خون جهت بررسی نتیجه ۱۵ روز بعد از ای وی اف انجام میگردد .



بخش ناباروری صبحی:

خرداد ۱۴۰۴