



رعايت نکات بعدانجام عکس رنگي از رحم (HSG) کد: MH-QI-۷۱۵



واحد تصويربرداری

- ۱- بعدازانجام هیستروسالپنگوگرافی نزدیکی نداشته باشید(۲۴ساعت)
- ۲- وسایل سنگین حمل نکنید .
- ۳- درصورت وجود خونریزی بیش از اندازه باید به پزشک مراجعه کنید .
- ۴-آنتی بیوتیک داکسی سایکلین هر ۱۲ ساعت یک عدد با دو لیوان آب میل شود و تا یک ساعت دراز نکشید.
- ۵- استفاده از مسکن مگنامیک اسید در صورت درد یا خونریزی (هر ۸ساعت میل شود) .

رئیس واحد تصویربرداری : خانم دکتر کشاورز



رعايت نکات بعدانجام عکس رنگي از رحم (HSG) کد: MH-QI-۷۱۵



واحد تصويربرداری

- ۱- بعدازانجام هیستروسالپنگوگرافی نزدیکی نداشته باشید(۲۴ساعت)
- ۲- وسایل سنگین حمل نکنید .
- ۳- درصورت وجود خونریزی بیش از اندازه باید به پزشک مراجعه کنید .
- ۴-آنتی بیوتیک داکسی سایکلین هر ۱۲ ساعت یک عدد با دو لیوان آب میل شود و تا یک ساعت دراز نکشید.
- ۵- استفاده از مسکن مگنامیک اسید در صورت درد یا خونریزی (هر ۸ساعت میل شود) .

رئیس واحد تصویربرداری : خانم دکتر کشاورز



رعايت نکات بعدانجام عکس رنگي از رحم (HSG) کد: MH-QI-۷۱۵



واحد تصويربرداری

- ۱- بعدازانجام هیستروسالپنگوگرافی نزدیکی نداشته باشید(۲۴ساعت)
- ۲- وسایل سنگین حمل نکنید .
- ۳- درصورت وجود خونریزی بیش از اندازه باید به پزشک مراجعه کنید .
- ۴-آنتی بیوتیک داکسی سایکلین هر ۱۲ ساعت یک عدد با دو لیوان آب میل شود و تا یک ساعت دراز نکشید.
- ۵- استفاده از مسکن مگنامیک اسید در صورت درد یا خونریزی (هر ۸ساعت میل شود) .

رئیس واحد تصویربرداری : خانم دکتر کشاورز



رعايت نکات بعدانجام عکس رنگي از رحم (HSG) کد: MH-QI-۷۱۵



واحد تصويربرداری

- ۱- بعدازانجام هیستروسالپنگوگرافی نزدیکی نداشته باشید(۲۴ساعت)
- ۲- وسایل سنگین حمل نکنید .
- ۳- درصورت وجود خونریزی بیش از اندازه باید به پزشک مراجعه کنید .
- ۴-آنتی بیوتیک داکسی سایکلین هر ۱۲ ساعت یک عدد با دو لیوان آب میل شود و تا یک ساعت دراز نکشید.
- ۵- استفاده از مسکن مگنامیک اسید در صورت درد یا خونریزی (هر ۸ساعت میل شود) .

رئیس واحد تصویربرداری : خانم دکتر کشاورز